

ПРИЧИНИ ГНІЙНО-СЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ ПОЛОГІВ ТА АБОРТІВ

Сумцов Г.О., доцент

СумДУ, кафедра акушерства та гінекології

Проведено вивчення причин та результатів лікування тяжких гнійно-септичних ускладнень після пологів та абортів за останні 10 років за матеріалами СОЦАГР. За цей період проліковано 30 жінок віком від 17 до 38 років із наступними тяжкими ускладненнями: перитоніт після кесаревого розтину у 17 ($56 \pm 9\%$), сепсис у 9 ($30 \pm 9\%$) та токсико-септичний шок у 4 ($13 \pm 6\%$) хворих.

З'ясовано, що у $80 \pm 9\%$ жінок вагітність перебігала на фоні хронічних, часто поєднаних захворювань, таких як анемія, кольпіт, хронічний пієлонефрит, варікозна хвороба, цукровий діабет. Поєднана прееклампсія була у половини вагітних. Пологи ускладнилися раннім або передчасним виливом навколоплідних вод і слабкістю пологової діяльності відповідно у 50 і 55% роділь.

Причинами септичних ускладнень після фізіологічних пологів були залишки плацентарної тканини. Фоном для гнійно-септичних ускладнень після абортів також послужили анемія, пієлонефрит, гломерулонефрит або кримінальні втручання.

Після проведення радикальних операцій (екстирпація матки з трубами, дренажування) та інтенсивної багатокomпонентної терапії в післяопераційному періоді усі хворі виписані з одужанням.

Отже, гнійно-септичні ускладнення після пологів та абортів провокуються широким спектром факторів і виникають навіть в пізні терміни. Ризик підвищується на ґрунті хронічних екстрагенітальних захворювань, прееклампсії та хірургічних втручань.